

BS7 KL 7.10 Palliatieve zorg

1. Een patiënt is gevallen van zijn fiets en heeft hierbij zijn knie verrekt en diverse schaafwonden. De patiënt heeft pijn. Van welk type pijn is hier sprake?
 - A) Nociceptieve somatische pijn
 - B) Nociceptieve viscerale pijn
 - C) Neuropathische somatische pijn
 - D) Neuropathische viscerale pijn
2. Hoe wordt plotseling optredende, tijdelijke, vaak hevige pijn genoemd die optreedt bij bestaande chronische pijnklachten?
 - A) Allodynie
 - B) Hyperalgesie
 - C) Pijnexacerbatie
 - D) Doorbraakpijn
3. Welke uitspraak m.b.t. een integrale benadering van pijn wordt vermeld in de richtlijn 'Pijn bij kanker'?
 - A) Het succes van de pijnbehandeling is sterk afhankelijk van de gedachtegang van de patiënt, daar waar optimisme de pijn verminderd
 - B) Voorlichting, heldere communicatie en continuïteit van zorg dragen in belangrijke mate bij aan het effect van de behandeling
 - C) De te verwachte bijwerkingen van de pijnmedicatie kunnen vanwege het verslechterende effect van angst op pijn beter niet worden benoemd
 - D) Het is van belang om complementaire zorg in te zetten (massage, ontspanningsoefeningen, etc.) omdat pijn voor een groot deel mentaal te beïnvloeden is.
4. Een patiënt met kanker ervaart nociceptieve pijn. Ze gebruikt hiervoor 2dd 20 mg morfine i.c.m. paracetamol en lactulose. Ondanks de medicatie geeft zij toch nog een pijnscore 7 op een schaal van 1 tot 10. De dosis, toedieningsfrequentie en toedieningsweg worden adequate geacht. De arts volgt de landelijke richtlijn 'Pijn bij kanker', wat is de volgende stap volgens het stappenplan?
 - A) Toevoegen van een NSAID
 - B) Toevoegen van een fantanylpleister
 - C) Perispinale toediening van morfine
 - D) Opioidrotatie
5. Welk geneesmiddel wordt als eerste keus gebruikt bij palliatieve sedatie?
 - A) Midazolam
 - B) Diazepam

- C) Propofol
- D) Morfine

6. Wat is het doel van palliatieve sedatie?

- A) Het verkorten van het leven zonder dat de patiënt zich hiervan bewust is
- B) Het verminderen van pijnklachten
- C) Het verlichten van het lijden van de patiënt
- D) Het behandelen van refractaire symptomen

7. Wat zijn belangrijke signalen van de naderende dood bij een palliatieve patiënt?

- A) Niet meer eten, langzame pols, snelle diepe ademhaling, verminderd bewustzijn
- B) Niet meer drinken, verminderde urineproductie, koud aanvoelen, spitse neus.
- C) Langzame pols, urine-incontinentie, toenemende alertheid, cheyne – stokes ademhaling
- D) Snelle pols, koude ledematen, icterus, dikke neus

1. A
2. D
3. B
4. D
5. A
6. C
7. B